

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&amp;GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 313244255-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

60,00 FRANCS

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,  
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

BULLETIN TECHNIQUE N° 21 - MERCREDI 30 JUILLET 1980 -

## VITICULTURE

### MILDIOU

Les précipitations orageuses qui se succèdent depuis le 25 juillet sont susceptibles d'entraîner quelques contaminations qui pourraient s'extérioriser dans les premiers jours d'Août. Pour éviter des repiquages à partir de ces attaques éventuelles, il est recommandé d'effectuer un traitement dès réception de ce bulletin.

### BLACK-ROT

Les premières attaques sur grappes sont observées dans les vignes où existaient généralement des taches sur feuilles. Dans ces vignobles, le traitement recommandé contre le mildiou sera également efficace contre le black-rot dans la mesure où l'on utilisera un fongicide valable contre ces deux champignons.

### OÏDIUM

Contre cette maladie qui rencontre actuellement des conditions favorables, adjoindre un anti-oïdium à la bouillie fongicide ou bien effectuer un pouillage spécial.

### POURRITURE GRISE (BOTRYTIS)

Dans certains cépages et selon les situations, le stade favorable à l'application du deuxième traitement va être progressivement atteint. On l'effectuera alors en suivant les préconisations formulées pour ce type de traitement (se référer au bulletin n° 17 du 30 Juin).

Dans les situations avancées où l'intervention contre l'eudémis et la cochylis en traitement dirigé sur les grappes n'a pas encore été effectuée (voir bulletin précédent), elle pourra être jumelée avec ce traitement.

## ARBORICULTURE

### MINEUSES CERCLEES (Leucoptera scitella)

Suite à notre bulletin précédent, dans les vergers où sévit particulièrement ce parasite, les éclosions d'oeufs de la seconde génération devraient se produire dans le courant de la semaine prochaine.

P 373 .../...

Dans ces vergers et notamment dans ceux où l'on envisage des exportations de fruits à destination du Canada et de l'Egypte, on effectuera à partir du 4 août, une pulvérisation à base de méthomyl (Lannate).

#### TORDEUSE DE LA PELURE (Capua)

Dans les vergers où des attaques de la génération précédente se sont produites, on effectuera dans le courant de la semaine prochaine, une pulvérisation à base d'azinphos (nombreuses spécialités) ou de méthomyl (Lannate) ou de trichlorfon (Dipterex 80).

En présence de mineuses (voir chapitre ci-dessus), on choisira le méthomyl.

#### CARPOCAPSE DES PRUNES

Dans certains vergers, les captures aux pièges sexuels sont très importantes. Il est donc recommandé d'effectuer une nouvelle intervention dans les meilleurs délais.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"AQUITAINE",

M. LARGE

Imprimerie de la Station  
de BORDEAUX  
Directeur-Gérant : J. THIAULT